

クリティカルパス 経皮尿道的前立腺切除術(TUR-P)

月日	/	/	/	/	
経過	入院日	手術日当日	手術後1日目	手術後2日目	退院日
検体・検査			血液検査をします。		
治療 (処置)		【手術前】 手術前に手術用の病衣・紙パンツに着替えます。 両足にストッキング装着します。 	心電図モニター・フットポンプを外します。 		
薬剤・内服	寝る前に下剤を服用します。	【手術前】 朝起きたらすぐに洗腸をします。 点滴をします。 手術日は持参のお薬は飲めません。 	朝より持参のお薬再開します。点滴は継続します。	点滴を終了します。	
活動	安静度に制限はありません。	【手術前】 安静度に制限はありません。 【手術後】 朝までベッドの上で安静にします。 	主治医の指示で歩行できます。		
食事	夕食を食べます。21時以降は絶食です。	朝から終日絶食です。手術後OS-1 1本500ml飲水できます。	朝から食事が始まります。		
排泄	尿量を測るため、瓶に尿を溜めます。	手術後は尿管を入れて帰室します。		主治医の指示により尿管を抜きます。尿量を確認するために尿を溜めます。性状を観察します。	
清潔	入浴は可能です。	入浴できません。	清拭	主治医に確認後シャワーが可能です。	
説明・指導	入院オリエンテーション 術前オリエンテーション 術後OS-1を飲むことができるため、1本500ml購入してください		痛みや他の症状がある場合は、看護師へお知らせください。	骨盤底筋運動をパンフレットに沿って行います。退院が決まりましたら、退院後の生活や次回の外来日程について看護師より説明いたします。お会計は、退院前日に概算をお知らせいたします。退院日の会計は、当日に事務員がお知らせにまいります。	

福岡和白病院

平成 年 月 日

治療を受けられる方

説明を受けられる方

主治医

担当看護師